

Clinac®

Eritromicina | Solução Cutânea

FOLHETO INFORMATIVO: Informação para o utilizador

clinac®

Eritromicina

Solução cutânea

Leia atentamente este folheto antes de utilizar o medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, contacte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

COMPOSIÇÃO:

Eritromicina a 20 mg/ml.

APRESENTAÇÃO:

Clinac é apresentado sob a forma farmacêutica de solução hidroalcoólica em frasco conta-gotas de 30 e de 100 ml.

ATIVIDADE:

Antibiótico tópico dérmico.

RESPONSÁVEL PELA INTRODUÇÃO NO MERCADO:

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6-6A

2795-225 Linda-a-Velha

Portugal



Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6-6A • 2795-225 Linda-a-Velha • Portugal

Clinac®

Eritromicina | Solução Cutânea

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Clinac solução cutânea, está especialmente indicado no controlo tópico da acne vulgaris.

CONTRAINDICAÇÕES:

Clinac está contraindicado em casos de hipersensibilidade ao fármaco (eritromicina) ou a qualquer dos componentes da formulação.

EFEITOS SECUNDÁRIOS:

Eritema, pele seca, prurido, descamação ou sensação de queimadura.

Contacte imediatamente um médico se tiver uma reação cutânea grave: erupção cutânea avermelhada descamativa com pequenos inchaços debaixo da pele e bolhas (pustulose exantemática). A frequência deste efeito secundário é desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis).

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:

Devido à presença do álcool, no excipiente do Clinac, este produto deve ser aplicado com o cuidado necessário para evitar o contacto com os olhos e ser utilizado unicamente em uso externo.

EFEITOS EM GRÁVIDAS E LACTENTES:

Desconhecem-se quaisquer relatos de problemas eventualmente surgidos durante a gravidez ou aleitação, quando do uso tópico da eritromicina. Contudo, a sua total segurança naqueles casos ainda não está completamente determinada.

Clinac®

Eritromicina | Solução Cutânea

EXCIPIENTES:

Álcool isopropílico, propilenoglicol, carbopol, álcool etílico e água para preparações injetáveis.

POSOLOGIA, MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Recomenda-se a aplicação de Clinac duas vezes por dia, diretamente sobre as lesões acneicas (depois de convenientemente limpas), utilizando o conta-gotas do frasco ou embebendo um pouco de algodão (ou um “cotonete”).

AVISOS:

- Um medicamento destina-se ao tratamento de uma situação objetiva. Para tal deverão cumprir-se escrupulosamente as indicações médicas.
- Aconselha-se o utente a comunicar ao seu médico ou farmacêutico a deteção de efeitos indesejáveis que não constem deste folheto informativo.
- Deve verificar-se sempre o prazo de validade impresso na embalagem exterior.
- Não guardar a temperaturas superiores a 25°C.
- Prazo de validade após a primeira abertura: 12 meses.
- Ao frasco da solução não deve ser dada qualquer outra utilização.
- Como todos os medicamentos, também este deverá ser mantido fora do alcance e da vista das crianças.

Este folheto foi revisto pela última vez em: novembro de 2020.